

Vacinas contra a COVID-19: O que você deve saber

Onde posso tomar a vacina?



Seu médico



Posto de saúde comunitário



Farmácias locais



Clínicas temporárias ou móveis

Como marco uma consulta?



Ligue para o seu médico ou marque uma consulta on-line

Acesse nosso site: vaccinelocator.doh.wa.gov/

Ou ligue para 1-800-525-0127 e pressione #.
O atendimento está disponível em vários idiomas.

Depende. É possível que você saiba sobre a clínica por causa de um amigo ou um membro da comunidade ou, então, pelas redes sociais. Pergunte a eles como fazer o cadastro.

O que devo levar ao ponto de vacinação?

Nas clínicas de vacinação em massa, pode ser necessário trazer algo que comprove seu local de moradia ou de trabalho no estado de Washington.

Não é necessário apresentar nenhum tipo de documento, mas pode ser que seja solicitado:

- identificação
- cartão do seguro
- número da segurança social



Você não precisa ser um cidadão dos Estados Unidos para tomar a vacina. Ninguém perguntará sobre sua situação de imigrante.

Dados pessoais somente serão usados para fins de saúde pública.

Quanto custa a vacina?

A vacina é fornecida gratuitamente. Você não deverá pagar nada por ela.



Preciso da segunda dose da vacina?



Algumas vacinas são administradas em duas ou três doses. Leva cerca de duas semanas após você ter sido totalmente vacinado para ter a proteção máxima. É possível que algumas pessoas precisem de uma a duas doses de reforço.

Acesse a página sobre [Doses de reforço da vacina contra a COVID-19](#) para obter mais informações.

Pfizer-BioNTech	Seis meses a quatro anos de idade: três doses, 21 dias após a primeira dose, 56 dias após a segunda dose Cinco anos de idade ou mais: duas doses, 21 dias de intervalo
Moderna	Seis meses de idade ou mais: duas doses, 21 dias de intervalo
Novavax	12 anos de idade ou mais: duas doses, 21 dias de intervalo
Johnson & Johnson	18 anos de idade ou mais: uma dose

Para obter mais informações



Acesse: COVIDVaccineWA.org ou DOH.WA.GOV/Coronavirus



Ligue: **1-800-525-0127** e pressione #. O atendimento está disponível em vários idiomas.

Quais são os efeitos colaterais?

É provável que você apresente sintomas dos efeitos colaterais, mas eles geralmente duram apenas um ou dois dias.

Você poderá sentir:

- Cansaço
- Dor de cabeça
- Dor muscular
- Calafrios
- Febre
- Náusea



No braço em que a vacina foi aplicada, você poderá sentir:

- Dor
- Vermelhidão
- Inchaço



No caso das vacinas administradas em duas doses, os efeitos colaterais após a segunda dose poderão ser mais fortes.

Ligue para 911 se apresentar uma reação alérgica. Inscreva-se no V-safe para relatar os efeitos colaterais: vsafe.cdc.gov.

Existe uma vacina que seja melhor do que as outras?

Nós recomendamos que você tome uma vacina de mRNA contra a COVID-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna) em vez da vacina de dose única da Johnson & Johnson (J&J).

No entanto, a vacina da J&J ainda está disponível, caso você prefira tomá-la. A Novavax também está disponível como uma alternativa à vacina de mRNA, caso você prefira outra opção. Converse com seu médico sobre suas opções.



O que a vacina contra a COVID-19 faz?




A vacina prepara seu corpo para desenvolver defesas contra a COVID-19 para evitar que você fique doente.

As vacinas são seguras?

Sim. Todas as vacinas foram testadas em **dezenas de milhares** de pessoas.

Elas demonstraram ser seguras em diferentes pessoas de várias raças e que tinham comorbidades, como obesidade, diabetes, problemas cardíacos, doenças hepáticas e HIV.



Department of Health (DOH, Departamento de Saúde) verifica os relatórios com frequência por questões de segurança.

Por que devo tomar a vacina?

Tomar a vacina fará com que você se mantenha seguro no trabalho e possa ver seus amigos e sua família novamente.

A probabilidade será muito mais baixa de você ficar gravemente doente, ser internado ou falecer devido à COVID-19.

